

**POS 7.10 EUTHANASIE****★ POINT DE CONTRÔLE CRITIQUE**

NIS :

Gestionnaire du site : Personne responsable :

IDENTIFICATION DU VÉTÉRINAIRE DÉTENTEUR D'UN DROIT DE PRATIQUE

Cette POS d'euthanasie a été mis au point en consultation avec un vétérinaire détenteur d'un droit de pratique avec qui une relation vétérinaire-client-patient est présente.

Nom du vétérinaire :

PROTOCOLE

Le personnel responsable doit suivre ce protocole chaque fois qu'un porc est euthanasié.	S'applique à la ferme	Importance										
1. Le gestionnaire du site doit s'assurer que les personnes responsables d'appliquer ce protocole sont adéquatement formées	<input type="checkbox"/>											
<div style="background-color: #f2f2f2; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">LISTE DES PERSONNES FORMÉES POUR EUTHANASIER DES PORCS</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Nom</th> <th>Stade de production</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Nom	Stade de production									<input type="checkbox"/>	Obligatoire
Nom	Stade de production											
2. Entretien de l'équipement servant à l'euthanasie												
a. L'équipement utilisé pour euthanasier les porcs est nettoyé et entretenu après s'en être servi et avant d'être entreposé, de sorte qu'il soit en bon état de fonctionnement lorsqu'il devra être utilisé à nouveau.	<input type="checkbox"/>											
b. <i>Autres bonnes pratiques de production :</i> _____ _____	<input type="checkbox"/>	Fortement recommandé										

Le personnel responsable doit suivre ce protocole chaque fois qu'un porc est euthanasié.	S'applique à la ferme	Importance																											
3. Préparation à l'euthanasie																													
a. Contenir les animaux qui devront être euthanasiés au besoin.	<input type="checkbox"/>	Fortement recommandé																											
b. Si le déplacement des porcs risque d'entraîner de la douleur et de la souffrance, il faudra les euthanasier là où ils se trouvent. i. Les porcs ne doivent pas être trainés, poussés, forcés à se déplacer sur des pattes cassées ou lorsque le mouvement entraîne douleur et souffrance.	<input type="checkbox"/>	Obligatoire																											
c. <i>Autres bonnes pratiques de production :</i> _____ _____	<input type="checkbox"/>	Fortement recommandé																											
4. Méthodes d'euthanasie																													
<p>a. Euthanasier rapidement les animaux qui doivent l'être et selon les méthodes répertoriées ci-dessous :</p> <table border="1" data-bbox="237 1062 1018 1808"> <thead> <tr> <th data-bbox="237 1062 550 1188">Catégories de porcs (poids)</th> <th data-bbox="550 1062 782 1188">Méthode d'euthanasie principale¹</th> <th data-bbox="782 1062 1018 1188">Méthode d'euthanasie de rechange²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="237 1188 550 1236">Exemple : truies et verrats</td> <td data-bbox="550 1188 782 1236">pistolet à tige</td> <td data-bbox="782 1188 1018 1236">arme à feu</td> </tr> <tr> <td data-bbox="237 1236 550 1314">Porcelets sous la mère (moins de 2,3 kg)</td> <td data-bbox="550 1236 782 1314"></td> <td data-bbox="782 1236 1018 1314"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="237 1314 550 1421">Porcelets sous la mère/porcelets en pouponnière (2,3 à 9 kg)</td> <td data-bbox="550 1314 782 1421"></td> <td data-bbox="782 1314 1018 1421"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="237 1421 550 1499">Porcelets en pouponnière/sevrés (9 à 32 kg)</td> <td data-bbox="550 1421 782 1499"></td> <td data-bbox="782 1421 1018 1499"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="237 1499 550 1577">Porcs en croissance (32 à 68 kg)</td> <td data-bbox="550 1499 782 1577"></td> <td data-bbox="782 1499 1018 1577"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="237 1577 550 1654">Porcs en engraissement (68 à 120 kg)</td> <td data-bbox="550 1577 782 1654"></td> <td data-bbox="782 1577 1018 1654"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="237 1654 550 1732">Cochettes/truies/verrats (120 à 200 kg)</td> <td data-bbox="550 1654 782 1732"></td> <td data-bbox="782 1654 1018 1732"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="237 1732 550 1808">Truies/verrats (plus de 200 kg)</td> <td data-bbox="550 1732 782 1808"></td> <td data-bbox="782 1732 1018 1808"></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="237 1839 927 1892">¹ Se reporter à la Fiche de renseignements sur les méthodes d'euthanasie pour déterminer la méthode d'euthanasie qui est adéquate.</p> <p data-bbox="237 1906 938 1938">² La méthode principale et la méthode de rechange peuvent être la même.</p>	Catégories de porcs (poids)	Méthode d'euthanasie principale ¹	Méthode d'euthanasie de rechange ²	Exemple : truies et verrats	pistolet à tige	arme à feu	Porcelets sous la mère (moins de 2,3 kg)			Porcelets sous la mère/porcelets en pouponnière (2,3 à 9 kg)			Porcelets en pouponnière/sevrés (9 à 32 kg)			Porcs en croissance (32 à 68 kg)			Porcs en engraissement (68 à 120 kg)			Cochettes/truies/verrats (120 à 200 kg)			Truies/verrats (plus de 200 kg)			<input type="checkbox"/>	Obligatoire
Catégories de porcs (poids)	Méthode d'euthanasie principale ¹	Méthode d'euthanasie de rechange ²																											
Exemple : truies et verrats	pistolet à tige	arme à feu																											
Porcelets sous la mère (moins de 2,3 kg)																													
Porcelets sous la mère/porcelets en pouponnière (2,3 à 9 kg)																													
Porcelets en pouponnière/sevrés (9 à 32 kg)																													
Porcs en croissance (32 à 68 kg)																													
Porcs en engraissement (68 à 120 kg)																													
Cochettes/truies/verrats (120 à 200 kg)																													
Truies/verrats (plus de 200 kg)																													

Le personnel responsable doit suivre ce protocole chaque fois qu'un porc est euthanasié.	S'applique à la ferme	Importance
b. <i>Autres bonnes pratiques de production</i> : _____ _____	<input type="checkbox"/>	Fortement recommandé
5. Confirmation de l'insensibilité		
a. Évaluer l'insensibilité du porc tout de suite après l'utilisation de la méthode d'euthanasie. i. <i>Méthodes utilisées pour évaluer l'insensibilité</i> : _____ (Exemples : réflexe du nerf cornéen (toucher l'oeil), piqûre sur le nez, observation de contraction musculaire suivie de pagayage, absence de respiration, n'essaie pas de se lever.)	<input type="checkbox"/>	Obligatoire
b. Si le porc présente des signes de retour de la sensibilité, réappliquer immédiatement la mesure d'euthanasie principale ou la mesure de rechange et confirmer l'insensibilité.	<input type="checkbox"/>	
c. <i>Autres bonnes pratiques de production</i> : _____ _____	<input type="checkbox"/>	Fortement recommandé
6. Confirmation du décès		
a. Confirmer le décès dans les cinq minutes après avoir confirmé l'insensibilité, et avant de déplacer le porc ou de le laisser sur place. Pour confirmer le décès, tous les indices suivants doivent être présents : i. Pupilles fixes et dilatés. ii. Insensible (consulter les méthodes pour confirmer l'insensibilité). iii. Absence de mouvement. iv. Absence de respiration.	<input type="checkbox"/>	Obligatoire
Autre(s) méthode(s) pour confirmer le décès : b. Si le porc est toujours vivant, mais insensible, attendre que la mort survienne ou appliquer une méthode secondaire (p. ex., saignée ou décérébration) pour confirmer le décès avant de déplacer le porc ou de le laisser sur place. i. <i>Méthode secondaire utilisée</i> : _____	<input type="checkbox"/>	Fortement recommandé
c. Documentez les porcs euthanasiés dans le Registre des mortalités (R-M).	<input type="checkbox"/>	Obligatoire

Le personnel responsable doit suivre ce protocole chaque fois qu'un porc est euthanasié.	S'applique à la ferme	Importance
d. <i>Autres bonnes pratiques de production</i> : _____ _____	<input type="checkbox"/>	Fortement recommandé

REGISTRE

Nom du registre		Importance
R-M	Registre des mortalités	Obligatoire